

Seguimiento de los Resultados anormales de la prueba de Papanicolaou



¿Qué significa una “prueba anormal de Papanicolaou”?

Cuando un resultado de la prueba de Papanicolaou no es normal (anormal) significa que se encontraron cambios celulares en el cuello uterino. Por lo general esto no significa que usted tiene cáncer de cuello uterino. Es importante hacer un seguimiento inmediato con su proveedor de salud para saber más sobre los resultados de su prueba y hacer más pruebas o recibir un tratamiento que puede ser necesario.

¿Qué causa cambios celulares en el cuello uterino?

Los cambios en el cuello uterino son probablemente causados por el virus del papiloma humano (VPH). Dependiendo de su edad o resultados de su prueba de Papanicolaou, su proveedor de salud puede pedir una prueba de VPH de su cuello uterino. La mayor parte del tiempo, cambios mínimos en el cuello del útero debido al VPH vuelven a la normalidad por sí solos. Pero cambios más serios pueden convertirse en cáncer si no se tratan. Encontrar y tratar los cambios celulares en el cuello uterino pueden prevenir el cáncer de cuello uterino.

¿Qué pasará si el resultado de mi prueba de Papanicolaou es anormal?

Algunos resultados anormales de la prueba de Papanicolaou significa que usted necesitará hacerse más pruebas de inmediato, mientras que otros no. Su proveedor de salud hará lo correcto para usted basado en los resultados de la prueba de su Papanicolaou. Su proveedor de la salud puede:

- Pedirle que regrese en uno o tres años para hacer otra prueba de Papanicolaou para ver si una

anormalidad menor se ha ido por sí sola. Esto se llama “espera vigilante”. Asegúrese de regresar cuando su proveedor de salud quiere volver a verla.

- Programar otra prueba inmediatamente para mirar con más atención su cuello uterino. Su proveedor de salud puede hacer esta prueba, o puede enviarlo a un especialista. Esta prueba se realiza con una lente especial que hace el cuello uterino parecer más grande (llamada colposcopia). Dependiendo de cómo se ve todo, el proveedor o especialista puede tomar una pequeña muestra de su cuello uterino (llamada biopsia) para estudiarla con más cuidado.

Si tengo más pruebas hechas ¿qué sucede a continuación?

- Si los resultados demuestran que usted no necesita ningún tratamiento, su proveedor de salud o especialista le hará saber cuándo debe hacerse la siguiente prueba de Papanicolaou.
- Si los resultados muestran que necesita tratamiento para sus células anormales, su proveedor de salud o especialista la va a tratar. Esto implica destruir o quitar las células anormales. Estos tratamientos pueden ser incómodos, pero por lo general se pueden hacer durante una visita. Después del tratamiento puede ser necesario visitas de seguimiento más frecuentes, para hacerse pruebas de Papanicolaou y así estar seguros de que las anomalías se han ido.



1-877-852-2585
www.cancernm.org

NEW MEXICO
DEPARTMENT OF
HEALTH

Seguimiento de los Resultados anormales de la prueba de Papanicolaou

¿Qué significa una “prueba anormal de Papanicolaou”?

Cuando un resultado de la prueba de Papanicolaou no es normal (anormal) significa que se encontraron cambios celulares en el cuello uterino. Por lo general esto no significa que usted tiene cáncer de cuello uterino. Es importante hacer un seguimiento inmediato con su proveedor de salud para saber más sobre los resultados de su prueba y hacer más pruebas o recibir un tratamiento que puede ser necesario.

¿Qué causa cambios celulares en el cuello uterino?

Los cambios en el cuello uterino son probablemente causados por el virus del papiloma humano (VPH). Dependiendo de su edad o resultados de su prueba de Papanicolaou, su proveedor de salud puede pedir una prueba de VPH de su cuello uterino. La mayor parte del tiempo, cambios mínimos en el cuello del útero debido al VPH vuelven a la normalidad por sí solos. Pero cambios más serios pueden convertirse en cáncer si no se tratan. Encontrar y tratar los cambios celulares en el cuello uterino pueden prevenir el cáncer de cuello uterino.

¿Qué pasará si el resultado de mi prueba de Papanicolaou es anormal?

Algunos resultados anormales de la prueba de Papanicolaou significa que usted necesitará hacerse más pruebas de inmediato, mientras que otros no. Su proveedor de salud hará lo correcto para usted basado en los resultados de la prueba de su Papanicolaou. Su proveedor de la salud puede:

- Pedirle que regrese en uno o tres años para hacer otra prueba de Papanicolaou para ver si una

anormalidad menor se ha ido por sí sola. Esto se llama “espera vigilante”. Asegúrese de regresar cuando su proveedor de salud quiere volver a verla.

- Programar otra prueba inmediatamente para mirar con más atención su cuello uterino. Su proveedor de salud puede hacer esta prueba, o puede enviarlo a un especialista. Esta prueba se realiza con una lente especial que hace el cuello uterino parecer más grande (llamada colposcopia). Dependiendo de cómo se ve todo, el proveedor o especialista puede tomar una pequeña muestra de su cuello uterino (llamada biopsia) para estudiarla con más cuidado.

Si tengo más pruebas hechas ¿qué sucede a continuación?

- Si los resultados demuestran que usted no necesita ningún tratamiento, su proveedor de salud o especialista le hará saber cuándo debe hacerse la siguiente prueba de Papanicolaou.
- Si los resultados muestran que necesita tratamiento para sus células anormales, su proveedor de salud o especialista la va a tratar. Esto implica destruir o quitar las células anormales. Estos tratamientos pueden ser incómodos, pero por lo general se pueden hacer durante una visita. Después del tratamiento puede ser necesario visitas de seguimiento más frecuentes, para hacerse pruebas de Papanicolaou y así estar seguros de que las anomalías se han ido.



1-877-852-2585
www.cancernm.org

NEW MEXICO
DEPARTMENT OF
HEALTH